

DIETILTOLUAMIDA, LOCIÓN

REVISIÓN 02 – AGOSTO 2016

SINONIMIAS: DEET loción

FÓRMULA CUANTITATIVA

DEET	c.s.
Glicerina	20 g
Etanol 70° c.s.p.	100 g.

CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS

DEET	Farmacopea
Glicerina	Farmacopea
Etanol 70°	Farmacopea

ELEMENTOS

Balanza	Indispensable
---------	---------------

DEFINICIÓN

Es una loción que debe contener no menos del 90.0%, ni más del 110.0% de la cantidad declarada de NN dietiltoluamida (DEET). La concentración máxima es 25% p/p.

METODOLOGÍA

Realizar los cálculos necesarios para pesar la cantidad de principio activo requerido.

En recipiente adecuado pesar el DEET y Glicerina, y disolverlos con Etanol 70°, completando a peso final.

La glicerina y DEET no son solubles entre sí, pero el alcohol solubiliza a los dos. Filtrar si es necesario.

ENVASADO Y ROTULADO

Se recomienda un envase plástico de polietileno de media o alta densidad (debido al efecto disolvente del DEET), con buen cierre.

Etiquetar acorde a Normas BPPF.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. Aspecto: Líquido límpido, incoloro y libre de elementos extraños.
2. Control de contenido: Ver PN-OF-08.
3. Hermeticidad del envase: Ver PN-OF-07.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura no superior a los 40°C.

FECHA DE VENCIMIENTO

Preparado intermedio 12 (doce) meses. Preparado terminado: 6 (seis) meses.

USOS

Repelente de uso tópico para mosquitos y otros insectos.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Uso tópico. Puede aplicarse también sobre la ropa.

COMPOSICIÓN

DEET ... g, excipientes (Glicerina, Etanol 70%) c.s.p.
100 g

PROPIEDADES Y USOS

Repelente de insectos, mosquitos, bichos colorados, jejenes, moscas, pulgas y tábanos. Es efectivo contra el mosquito *Aedes aegypti* (dengue).

POSOLOGÍA

Aplicar cada 2 o 3 horas en las partes expuestas de brazos, piernas, cara y cuello. Evitar tocar la nariz, la boca y los ojos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga.

EVENTOS ADVERSOS

Aplicado sobre mucosas y ojos puede producir ardor, dolor de ser así lavar con abundante agua fría.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS

No se recomienda su uso en menores de 2 años.

No exponer a altas temperaturas. No ingerir. Evitar el contacto con ojos y mucosas. Lavar bien las manos luego de su aplicación.

INTOXICACIONES Y SOBREDOSIS

Ante un mal uso del medicamento, ingesta accidental o sobredosis comunicarse con la Farmacia o con los siguientes Centros de Intoxicaciones:

➤ Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/224

➤ Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

➤ Hospital de niños de la Plata: (0221) 451-5555

➤ Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

CONSERVACIÓN

A temperatura ambiente (no mayor de 40°C). Mantener envase cerrado para evitar evaporación. No usar luego de la fecha de vencimiento.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto ha sido formulado acorde al Códex Farmacéutico Bonaerense 2º Edición, en la farmacia: Datos completos de la farmacia, con dirección, TE, horarios de atención, y nombre del DT